

# Bicillin (Benzathine Penicillin)

## What is Bicillin?

Bicillin is a type of penicillin. Bicillin, and other Penicillins, belong to the family of medicines called antibiotics. Antibiotics such as Bicillin are used to treat certain kinds of infections.

## How do I take Bicillin?

1. The nurse or doctor will give you two injections (shots) of Bicillin - one shot in each hip. This may be all you will need, or the nurse or doctor may ask you to come back to the clinic in one week for two more shots of Bicillin. If you will need more Bicillin shots, it is very important that you come back to the clinic in one week. If you are late for these second, and possible third, Bicillin shots, you will have to start over again.
2. You will be asked to stay in the clinic for 30 minutes after you have received the injections of Bicillin. **STAY IN THE CLINIC FOR THE FULL 30 MINUTES!** Reactions to Bicillin are not common; however, if there is a reaction it will usually occur within 30 minutes after the injection. Tell the nurse or doctor immediately if you begin to have any of the following problems:  
\* Difficulty breathing      \* Choking sensation      \* Loss of consciousness      \* Convulsions (seizures)  
\* Wheezing      \* Itching      \* Hives      \* Skin rash
3. A few hours after you have received the Bicillin shots, you may develop a fever, headache, pain in your joints, and nausea. You may feel tired and your heart may feel like it is beating fast. If you have a lesion (sore) or a rash, it may get worse. This is caused by the Bicillin getting rid of the infection that you have. This is not a reaction to Bicillin. These problems should go away in about 24 hours. Tylenol or aspirin, drinking lots of fluids, and rest should make you feel better.

## What are the side effects of Bicillin?

Along with its needed effects, a medicine may cause some unwanted effects. Although not all of these side effects may occur with Bicillin, if they do occur they may need medical attention.

Get emergency help immediately if any of the following side effects occur:

- |                        |                         |                     |                          |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| * Difficulty breathing | * Hives                 | * Choking sensation | * Itching                |
| * Wheezing             | * Loss of consciousness | * Skin rash         | * Convulsions (seizures) |

In addition to the side effects mentioned above, check with your doctor or nurse if any of the following side effects occur:

- |                                 |            |   |             |
|---------------------------------|------------|---|-------------|
| * Unusual tiredness or weakness | * Fever    | * Swelling of the face and ankles                 | * Dizziness |
| * Blood in urine                | * Nausea   | * Unusual bleeding or bruising                    | * Vomiting  |
| * Increased thirst              | * Diarrhea | * Passage of large amounts of light-colored urine |             |

Other side effects not listed above may also occur in some people. If you notice any other effects check with your doctor or nurse.

## What should I tell the nurse or doctor before I am given Bicillin?

To decide on the best treatment for your infection, your nurse or doctor should be told:

1. If you have ever had any unusual or allergic reaction to penicillin or cephalosporins.
2. If you have any of the following medical problems:  
\* Allergies (such as asthma, eczema, hay fever, hives)      \* Kidney disease      \* Mononucleosis (infectious "mono")  
\* Stomach or intestinal disease, especially colitis (severe diarrhea), including diarrhea caused by antibiotics      \* Liver disease
3. If you are taking any other prescription or nonprescription medicine.

## What precautions should I take after getting Bicillin?

1. The nurse or doctor will give you two injections (shots) of Bicillin in your hips. Any pain following the injections should go away within a day or two. If you notice an increase in pain, swelling, or redness at the sites of the injections, check with our nurse or doctor.
2. Severe diarrhea may be a sign of a serious side effect. Do not take any diarrhea medicine without first checking with your doctor. Diarrhea medicines may make your diarrhea worse or make it last longer.
3. If you have ever had an allergic reaction to Penicillin, you may want to carry a medical identification (ID) card, or wear a medical ID bracelet stating this.
4. The nurse or doctor may want to treat your sexual partner(s) at the same time you are being treated, even though (s)he has no symptoms. This will help you from getting the infection back again from your partner(s). Until both you and your partner(s) have received all the medicine, you should not have sex.
5. If your symptoms do not get better within a few days, or if they get worse, check with your nurse or doctor.

For more information, call the clinic:



# Bicillin (Benzathine Penicillin)

## ¿Qué es Bicillin?

Bicillin es un tipo de penicilina. Bicillin y otras penicilinas, pertenecen a la familia de los medicamentos llamados antibióticos. Antibióticos como la Bicillina son usados para tratar ciertas clases de infecciones.

## ¿Cómo debo usar Bicillin?

1. La enfermera o doctor le pondrá dos inyecciones de Bicillin, una inyección en cada cadera, esto será posiblemente todo lo que usted necesite o quizás la enfermera o doctor le pedirá que regrese a la clínica en una semana o dos para que le pongan más inyecciones de Bicillin. Si usted necesita más inyecciones de Bicillin, es muy importante que regrese a la clínica en una semana. Si usted regresa tarde para la segunda o posiblemente tercera inyección de Bicillin, usted tendrá que empezar de nuevo.
2. A usted se le pedirá que se quede en la clínica por un periodo de 30 minutos después de haber recibido la inyección de Bicillin.

QUÉDESE EN LA CLÍNICA LOS 30 MINUTOS EXACTOS. Las reacciones a Bicillin no son comunes, pero si ocurren, estás usualmente ocurrirán en un lapso de 30 minutos de haber recibido la inyección. Si usted tiene cualquiera de estos síntomas, avísele inmediatamente a su enfermera o doctor:

\* Dificultad para respirar      \* Sensación de ahogamiento      \* Pérdida de la conciencia      \* Convulsiones (ataques)

\* Silbidos al respirar      \* Picazón      \* Urticaria      \* Erupciones en la piel

3. Despues de algunas horas de haber recibido la inyección de Bicillin, usted puede desarrollar fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y náusea. Usted posiblemente se sienta cansado y su corazón posiblemente sienta que está latiendo rápidamente. Si usted tiene una lesión (ampolla) o erupciones, estas pueden empeorar. Esto es debido a que el medicamento está peleando contra la infección. Esto no es una reacción a Bicillin. Estos problemas se quitarán en un lapso de 24 horas. Tomar Aspirina o Tylenol, beber muchos líquidos y descansar le harán sentirse mejor.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios de Bicillin?

Junto con los efectos deseados, algunos medicamentos pueden causar efectos no deseados. Sin embargo, no todos estos efectos secundarios pueden ocurrir con Bicillin, si ocurren, puede ser que necesite atención médica.

Si cualquiera de estos efectos secundarios ocurren, pida ayuda inmediatamente.

\* Dificultad para respirar      \* Urticaria      \* Sensación de ahogamiento      \* Picazón      \* Silbidos al respirar

\* Pérdida de la conciencia      \* Erupciones en la piel      \* Convulsiones (ataques)

En adición a los efectos secundarios mencionados anteriormente, hable con su doctor o enfermera si cualquiera de los siguientes efectos secundarios ocurrir:

\* Cansancio o debilidad inusual      \* Fiebre      \* Hinchazón en la cara o tobillos      \* Sangre en la orina

\* Mareos      \* Nausea      \* Hematomas o sangrado inusual      \* Vómitos      \* Diarrea

\* Grandes cantidades de orina con leve color      \* Sed

Otros efectos secundarios no listados anteriormente pueden ocurrir en algunas personas. Si usted nota cualquier otro efecto secundario hable con su doctor o enfermera.

## Antes de tomar Bicillin, ¿Qué debo decirle al doctor o enfermera?

Para decidir cual es el mejor tratamiento para su infección, su enfermera o doctor deben saber:

1. Si usted alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica inusual a Penicilina o Cephalosporins.
2. Si usted tuvo o ha tenido cualquiera de los siguientes problemas médicos:
  - \* Alergias (tales como asma, eczema, fiebre del heno, urticaria)      \* Enfermedad en los riñones
  - \* Mononucleosis (infección "mono.")      \* Enfermedad en el hígado
  - \* Enfermedad del estómago o de los intestinos, especialmente colitis (diarrea severa), incluyendo la diarrea causada por antibióticos
3. Si usted está tomando algún medicamento recetado o sin receta.

## ¿Qué precauciones debo de tener mientras estoy tomando Bicillin?

1. La enfermera o doctor le dará dos inyecciones de Bicillin en sus caderas. Cualquier dolor que sienta después de la inyección, se le quitará en un par de días. Si usted nota un incremento del dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar donde le pusieron la inyección, consulte con su doctor o enfermera.
2. Diarrea severa puede ser el síntoma de un efecto secundario serio. No tome ninguna medicina contra la diarrea sin hablar antes con su doctor.  
Los medicamentos para la diarrea pueden hacer que su diarrea empeore o dure por mas tiempo.
3. Si usted ha tenido una reacción alérgica a Penicilina, debería tener con usted una tarjeta de identificación, o usar una identificación médica que dice esto.
4. La enfermera o doctor pueden querer darle el tratamiento a su pareja(s) sexual(es) al mismo tiempo que a usted se le da, aunque dicha pareja sexual no tenga ningún síntoma de la enfermedad. Esto le ayudará a evitar que vuelva a tener la infección. Usted y su pareja no deberían tener relaciones sexuales, hasta que haya recibido todo el tratamiento.
5. Si los síntomas no mejoran en un par de días o si empeoran, consulte con su enfermera o doctor.

Para más información, llame a la clínica: